

STILLEN IN »BABYFREUNDLICHEN KLINIKEN« – WAS IST ANDERS?

Hebammenforum 7/2021; 22: 42–44

- 1 WHO/Unicef-Initiative Babyfreundlich: 100 Babyfreundliche Geburts- und Kinderkliniken in Deutschland. 2017. www.babyfreundlich.org/eltern/presse/detailansicht/news/100-babyfreundliche-geburts-und-kinderkliniken-in-deutschland.html (Zugriff 19.5.21)
- 2 Abou-Dakn M, Meese G: Geburtshilfe. Das »Babyfreundliche Krankenhaus«: von der Entbindungsklinik zur Bindungsklinik. *Geburtsh Frauenheilk* 2009; 69: 647–649
- 3 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Spiegel H, Meyer N et al.: STELLA-Studie zum Ernährungsverhalten im Säuglingsalter. Interventionsprojekt zur Verbesserung der Stillbedingungen in einer Modellregion. Abschlussbericht. München 2011
- 4 de Onis M, Garza C, Onyango AW et al.: WHO growth standards for infants and young children. *Arch Pediatr* 2009; 16: 47–53
- 5 de Onis M, Onyango AW: The Centers for Disease Control and Prevention 2000 growth charts and the growth of breastfed infants. *Acta Paediatr* 2007; 92: 413–419
- 6 Friedrich J, Harder U: Besondere Stillsituationen und Stillberatung. In: Harder U (Hrsg.): *Wochenbett in der Klinik und zu Hause*. Hippokrates, 4. Aufl 2013
- 7 Jöllenbeck M: Identifikation wirksamer Interventionsmaßnahmen zur Stillförderung. Eine differenzierte Betrachtung unter Berücksichtigung des sozioökonomischen Status. Dissertation, Universität Bremen 2012
- 8 Kersting M, Dulon M: Fakten zum Stillen in Deutschland – Ergebnisse der SuSe-Studie. *Monatsschr Kinderheilk* 2002; 150: 1196–1201
- 9 Lange M, Butschalowsky HG, Jentsch F et al.: Die erste KiGGS-Folgebefragung (KiGGS Welle 1). *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz* 2014; 57: 747–761
- 10 Rebhan B: Die prospektive Kohortenstudie »Stillverhalten in Bayern«: Analyse von Daten zur Kindergesundheit, zur Säuglingsernährung und zu Genussmittelkonsum und Rauchverhalten der Mütter. Dissertation, Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München 2008
- 11 Rubin D: Stillen in Deutschland. *Ernährung im Fokus* 2013; 13: 200–205
- 12 Schwegler U, Kohlhuber M, Twardella D et al.: Einfluss der Stillbedingungen in den ersten Lebenstagen auf die Dauer des ausschließlichen Stillens. *Geburtsh Frauenheilk* 2008; 68: 607–614
- 13 von der Lippe E, Brettschneider AK, Gutsche J et al.: Einflussfaktoren auf Verbreitung und Dauer des Stillens in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz* 2014; 57: 849–859
- 14 Weissenborn A, Abou-Dakn M, Bergmann R et al.: Stillhäufigkeit und Stilldauer in Deutschland – eine systematische Übersicht. *Gesundheitswesen* 2016; 78: 695–707
- 15 WHO: Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. 2003
- 16 WHO/Unicef-Initiative Babyfreundlich (BFHI): Initiative Babyfreundliches Krankenhaus 2018. www.babyfreundlich.org/fachkraefte/initiative-babyfreundlich/ueber-die-initiative.html (Zugriff 19.5.21)
- 17 WHO/Unicef-Initiative Babyfreundlich (BFHI): Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen von WHO und UNICEF. www.babyfreundlich.org/fachkraefte/fachinformationen/10-schritte.html (Zugriff 19.5.21)
- 18 WHO/Unicef-Initiative Babyfreundlich (BFHI): Zehn Schritte B.E.St.® für eine Babyfreundliche Kinderklinik. 2012